

**Vänligen fyll i detta avsnitt
eller be din läkare fylla i**

Patientens namn _____

Födelsedatum _____

Indikation _____

Dos _____ mg två gånger dagligen

Läkarens namn _____

Läkarens telefonnummer _____

 Bristol-Myers Squibb



Information till patienten

- Ta Eliquis® regelbundet enligt instruktionerna. Om du missar en dos, ta den så snart du kommer ihåg och fortsätt följa ditt doseringsschema.
- Sluta inte ta Eliquis® utan att rådfråga din läkare, eftersom du riskerar att få en stroke eller andra komplikationer.
- Eliquis® hjälper till att förtunna blodet. Emellertid kan detta öka risken för blödning.
- Tecken och symtom på blödning kan vara blåmärken eller blödning under huden, svartfärgad avföring, blod i urinen, näsblod, yrsel, trötthet, blekhet eller svaghet, plötslig svår huvudvärk, att man hostar blod eller kräks blod.
- Om blödningen inte slutar av sig själv, **sök medicinsk vård omedelbart.**
- Om du behöver opereras ska du tala om för läkaren att du använder Eliquis®.

**Jag behandlas med Eliquis®
(apixaban), ett antikoagulantium
för att förhindra blodproppar**

Information till vårdpersonal

- Eliquis® (apixaban) är ett oralt antikoagulantium som verkar genom att direkt selektivt hämma faktor Xa.
- Eliquis® kan öka risken för blödning. Om en större blödning inträffar ska apixaban-behandlingen omedelbart avbrytas.
- Behandling med Eliquis® kräver inte rutinmässig koncentrationsmätning. Ett kalibrerat kvantitativt anti-faktor Xa test kan vara till hjälp under exceptionella omständigheter, t.e.x vid överdosering och akut kirurgi (protrombintid (PT), internationellt normaliserat ratio (INR) och aktiverad partiell tromboplastintid (aPTT) koaguleringsstest rekommenderas inte) – se Produktresumé.

1365265



Patientkort

Eliquis®
(apixaban)

**Bär med dig detta kort
vid alla tillfällen**

**Visa detta kort på apoteket,
hos tandläkaren och för
all annan sjukvårdspersonal
som behandlar dig.**

CVSE16NP07018-01 APR 2017 CVSE17NP02644-01