



Patientkort

Eliquis[®]
(apixaban)

Bär med dig detta kort
vid alla tillfällen.

Visa detta kort på apoteket, hos tandläkaren och för
all annan sjukvårdspersonal som behandlar dig.

Information till patienten

- Ta Eliquis regelbundet enligt instruktionerna. Om du missar en dos, ta den så snart du kommer ihåg och fortsätt följa ditt doseringsschema.
 - Sluta inte ta Eliquis utan att rådfråga din läkare, eftersom du riskerar att få en stroke eller andra komplikationer.
 - Eliquis hjälper till att förtunna blodet. Emellertid kan detta öka risken för blödning.
-
- Tecken och symtom på blödning kan vara blåmärken eller blödning under huden, svartfärgad avföring, blod i urinen, näsblod, yrsel, trötthet, blekhet eller svaghet, plötslig svår huvudvärk, att man hostar blod eller kräks blod.
 - Om blödningen inte slutar av sig själv, **sök medicinsk vård omedelbart.**
 - Om du är i behov av kirurgi eller invasiva ingrepp ska du tala om för läkaren att du använder Eliquis.

Jag behandlas med Eliquis (apixaban) ett antikoagulantium för att förhindra blodproppar

Information till vårdpersonal

- Eliquis (apixaban) är ett oralt antikoagulantium som verkar genom att direkt selektivt hämma faktor Xa.

- Eliquis kan öka risken för blödning. Om en större blödning inträffar ska apixabanbehandlingen omedelbart avbrytas.
- Behandling med Eliquis kräver inte rutinmässig koncentrationmätning. Ett kalibrerat kvantitativt anti-faktor Xa test kan vara till hjälp under exceptionella omständigheter, t.e.x vid överdosering och akut kirurgi (protrombintid (PT), internationellt normaliserat ratio (INR) och aktiverad partiell tromboplastintid (aPTT) koaguleringsstest rekommenderas inte) – se Produktresumé.
- Ett läkemedel för reversering av anti-faktor Xa-aktiviteten finns tillgängligt.

Vänligen fyll i detta avsnitt eller be din läkare fylla i

Namn:

Födelsedatum:

Indikation:

Dos: mg två gånger dagligen

Läkarens namn:

Läkarens telefonnummer: