



1365265A3

Patientkort

Eliquis[®]
(apixaban)

Bär med dig detta kort
vid alla tillfällen

Visa detta kort på apoteket, hos tandläkaren och för
all annan sjukvårdspersonal som behandlar dig.

Information till patienten

- Ta Eliquis regelbundet enligt instruktionerna. Om du missar en morgondos, ta den så snart du kommer ihåg och den kan tas tillsammans med kvällsdosen. En missad kvällsdos kan bara tas under samma kväll. Ta inte två doser nästa morgon, utan fortsätt följa ditt doseringsschema två gånger dagligen enligt rekommendationen dagen därpå.
- Sluta inte ta Eliquis utan att rådfråga din läkare, eftersom du riskerar att få en stroke eller andra komplikationer.
- Eliquis hjälper till att förtunna blodet. Emellertid kan detta öka risken för blödning.
- Tecken och symtom på blödning kan vara blåmärken eller blödning under huden, svartfärgad avföring, blod i urinen, näsblod, yrsel, trötthet, blekhet eller svaghet, plötslig svår huvudvärk, att man hostar blod eller kräks blod.
- Om blödningen inte slutar av sig själv, **sök medicinsk vård omedelbart.**
- Om du är i behov av kirurgi eller invasiva ingrepp ska du tala om för läkaren att du använder Eliquis.

Jag behandlas med Eliquis (apixaban) ett antikoagulantium för att förhindra blodproppar

Information till vårdpersonal

- Eliquis (apixaban) är ett oralt antikoagulantium som verkar genom att direkt selektivt hämma faktor Xa.
- Eliquis kan öka risken för blödning. Om en större blödning inträffar ska apixabanbehandlingen omedelbart avbrytas.
- Behandling med Eliquis kräver inte rutinmässig koncentrationmätning. Ett kalibrerat kvantitativt anti-faktor Xa test kan vara till hjälp under exceptionella omständigheter, t.e.x vid överdosering och akut kirurgi (protrombintid (PT), internationellt normaliserat ratio (INR) och aktiverad partiell tromboplastintid (aPTT) koaguleringstest rekommenderas inte) – se Produktresumé.
- Ett läkemedel för reversering av anti-faktor Xa-aktiviteten finns tillgängligt.

Vänligen fyll i detta avsnitt eller be din läkare fylla i

Namn:

Födelsedatum:

Indikation:

Dos: mg två gånger dagligen

Läkarens namn:

Läkarens telefonnummer: